


## Причины возникновения речевых нарушений



Наследственная предрасположенность.

длительные соматические заболевания

неправильная речь окружающих

дефицит речевых контактов

двуязычие в семье

недостаточное внимание к речевому развитию ребенка со стороны взрослых

патология беременности, родов, асфиксия

детские инфекции, травмы головы.

## Этиология нарушений речи.

### **Выделяют 3 критических периода в развитии речевой функции:**


✓ 1-2 года - начало речевого развития, основы коммуникации поведения.

Критический период 14-18 мес.

✓ 3 года - развитие связной речи. Переход от ситуационной речи к контекстной, рассогласованность работы Ц.Н.С. и сосудистой системы (особенности поведения).

✓ 6-7 лет - начало развития письменной речи, нагрузка на Ц.Н.С.

## КЛИНИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ



## ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ



## **Внешние (экзогенные) причины речевых нарушений**

- Речь развивается по подражанию, поэтому некоторые речевые нарушения (заикание, нечеткость произношения, нарушение темпа речи) могут иметь в своей основе подражание.
- Речевые нарушения часто могут возникать при различных психических травмах .
- «Двуязычие» в семье
- Сюсюкание с детьми, выражающееся в подлаживании взрослых под детскую речь.
- Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие головного мозга, «ответственное» за речевую функцию.

## **Внутренние (эндогенные) причины речевых нарушений**

- Заболевания матери во время беременности.
- Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и ушибы
- Аллергии матери.
- Токсикоз беременности, не зависимо от срока беременности.
- Иммунологическая несовместимость крови матери и ребенка.
- Многообразная акушерская патология .
- Курение во время беременности, употребление алкоголя.
- Неблагоприятный возраст матери для беременности.
- Особые психические нагрузки матери в период беременности.
- Наследственная предрасположенность, генетические аномалии.
- Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни.

# Профилактика речевых нарушений.



Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с этим возрастает необходимость совместной работы логопедов, учителей, воспитателей по предупреждению речевых нарушений у детей.

Логопедическая работа включает в себя несколько направлений. Это и преодоление имеющихся нарушений речи у детей, и предупреждение возможных вторичных нарушений речи, и параллельная коррекция и доразвитие других психических функций, таких как слухоречевое и зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно-логическое мышление.

## Профилактика речевых расстройств

- Забота о состоянии здоровья будущих родителей
- Создание условий для нормального протекания беременности и родов
- Забота о физическом и нервно-психологическом здоровье ребенка и о сохранности его речевых органов
- Забота о правильном речевом развитии ребенка, создание необходимых для этого социально-бытовых условий